

Poussins de 1 jour.

- A la sortie de l'éclosoir les poussins ont besoin de chaleur environ 37,5°C au sol sous la source de chaleur. Evitez les courants d'air, ces animaux y sont très sensibles.
- Apportez un aliment riche en protéine (minimum 25%) type dindonneau-pintadeau
- Eau de boisson : évitez l'eau du robinet, préférez lui une eau de source ou de pluie propre.
- Gardez ces oiseaux jusqu'à l'âge de 5 semaines minimum dans vos bâtiments avant la mise en volière.

Oiseaux de plus de 5 semaines.

- Mise en volière possible si le temps est clément (pas de pluie, et nuit pas trop fraîche $\pm 10-12^{\circ}\text{C}$)
- Appliquez un dispositif anti-piquage (lunettes speed bec) dès la sortie des oiseaux pour éviter la mortalité (animaux cannibales) et favoriser ainsi un meilleur plumage à vos oiseaux.
- Faire un vermifuge préventif une fois par mois uniquement en volière.
- Faire un anti-coccidiose en préventif une fois par mois. Eviter de mélanger les deux traitements.
- Faire une cure de vitamines une fois par mois dès les premiers jours.

LACHEZ LES ANIMAUX A VOTRE CONVENANCE EN VEILLANT DE GARDER TOUJOURS DES APPELANTS POUR EVITER LA DISPARITION DE VOS ANIMAUX.